

Melovem® 30 mg/ml

[Înapoi la prezentarea produsului](#)



Nr. autorizație:
EU/2/09/098/005 - 007

Pentru care specii este destinat acest produs



Compoziție

1 ml conține:
Meloxicam 30 mg

[citeste mai mult →](#)

Timp de așteptare:

Bovine:

Carne și organe: 15 zile
Lapte: 5 zile

Porcine:

Carne și organe: 5 zile

Indicații pentru utilizare

Bovine:

Indicat pentru utilizare în infecția respiratorie acută, împreună cu tratamentul antibiotic corespunzător, pentru a reduce simptomatologia clinică la bovine.

Indicat pentru utilizare în diaree, în combinație cu tratamentul de rehidratare orală, pentru a reduce simptomatologia clinică la vițeei cu vârste mai mari de o săptămână și la tineretul bovin nelactant.

Indicat ca medicație adjuvantă în tratamentul mastitei acute, în combinație cu tratamentul antibiotic.

Porcine:

Indicat pentru utilizare în tulburările locomotorii non-infecțioase, pentru a reduce simptomele de șchiopătură și inflamație.

Indicat ca medicație adjuvantă în tratamentul septicemiei și toxiemiei puerperale (sindromul de mastită-metrită-agalaxie), împreună cu tratamentul antibiotic corespunzător.

Alte detalii

- Forma de prezentare

Flacon de 50 ml.
Flacon de 100 ml.

- Forma farmaceutică

Soluție injectabilă.

- Doze

Bovine:

Administrare unică, subcutanată, la doza de 0,5 mg meloxicam per kg greutate corporală (de exemplu 2,5 ml per 150 kg greutate corporală), în combinație cu tratamentul antibiotic sau cu tratamentul de rehidratare orală, după caz.

Porcine:

Administrare intramusculară unică, la doza de 0,4 mg meloxicam per kg greutate corporală (de exemplu 2,0 ml per 150 kg greutate corporală), în combinație cu tratamentul antibiotic, după caz.

Dacă este necesar, o a doua doză de meloxicam poate fi administrată după 24 de ore.

A se evita introducerea de factori contaminanți în cursul administrării.

Atunci când tratați grupuri de animale, utilizați un ac de aspirație pentru a evita perforarea excesivă a dopului.

Numărul maxim de perforari trebuie limitat la 20.

- Contraindicații

Nu se utilizează pentru animale care prezintă afecțiuni hepatice, cardiace sau renale sau tulburări de tip hemoragic, precum și în cazurile în care există dovezi de leziuni gastrointestinale ulcerogene.

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

În cazul tratamentului pentru diaree la bovine, nu se utilizează pentru animale cu vârsta mai mică de o săptămână.

- Efecte secundare

Inaplicabil

- Condiții de depozitare/Perioada de valabilitate

lorem ipsum

Pentru achiziționarea acestui produs, vă rugăm contactați medicul dumneavoastră veterinar. Sunteți medic veterinar?
Contactați biroul nostru.

[Contact](#)